



Hilos Tensores

También llamado DERMOLIFTING MEDIANTE IMPLANTE DE HILOS TENSORES DE PDO

Es una técnica de rejuvenecimiento facial y corporal para prevenir y tratar la flacidez. Consiste en la inserción de hilos de sutura de polidioxanona (PDO), material reabsorbible, en cara, cuello, brazos, abdomen y parte interna de piernas con unas agujas finas, sin realizar incisiones, ni anclajes. Estos hilos llevan utilizándose ya años en cirugía cardíaca y oftalmológica por lo que está ampliamente contrastada su seguridad, biocompatibilidad y son totalmente reabsorbibles. Su objetivo es la reestructuración y elevación de los tejidos.

El hilo implantado en la piel genera una fibrosis a su alrededor o formación de hilos de colágeno propio dando lugar a un lifting biológico "autolifting" inducido por la producción de los fibroblastos. La verdadera innovación es crear un tejido propio de soporte por efecto biológico (la piel genera sus propios hilos naturales).

El hilo empleado se reabsorbe a los 6 meses, pero al perdurar los hilos por fibrosis natural, el efecto tensor dura de 12 a 18 meses, dependiendo del tipo de piel, la edad, el grado de descolgamiento y la respuesta individual.

La colocación de los hilos es sencilla, prácticamente indolora y rápida. Comienza por eliminar cualquier impureza de la piel de la zona a tratar, una vez limpia, se aplica un antiséptico y se delimita la zona a tratar realizando un dibujo de entramado de líneas que servirá de guía para la colocación subdérmica de los hilos. Se introduce mediante finas agujas de diferentes longitudes según los segmentos que vayamos a tratar.

Una vez introducido el material se procede a retirar la cánula y el hilo queda tensado sin necesidad de anclajes de ningún tipo.

La sesión se puede repetir a los 3 meses si se quiere estimular más el tensado y posteriormente cada año o año y medio dependiendo del grado de flacidez. Se puede realizar con anestesia local, pero en la mayoría de los casos es bien tolerado, sin tener que recurrir a esta.

El proceso tiene una duración de 30 minutos y el paciente puede incorporarse a su vida habitual tras unas horas. Los cuidados postratamiento son muy simples. Ausencia de efectos adversos significativos, salvo ligero enrojecimiento o inflamación que cede pronto y posibles hematomas.

Son compatibles con otros tratamientos médico-estéticos. No se deberán aplicar en pacientes con infecciones o inflamaciones, enfermedades sistémicas autoinmunes y los pacientes anticoagulados.

No sustituye al lifting quirúrgico. Es una alternativa para "prevenir", "reparar", y "mejorar" la flacidez gravitacional y retrasar durante años un lifting quirúrgico.

Clínica Gastón

Medicina Estética Nutrición Salud

clinicagaston.com